



Come somministrare un farmaco a cane e gatto



Consigli pratici per una somministrazione
sicura, serena ed efficace



COMPRESSE
E CAPSULE



LIQUIDI E
SIRINGHE



TECNICHE
E SICUREZZA



CANE E GATTO:
DIFFERENZE



CONSIGLI
UTILI



Come somministrare un farmaco a cane e gatto

Guida pratica per farlo in sicurezza e senza stress

Introduzione

Prima o poi capita a tutti.

Un antibiotico, una compressa per il cuore, uno sciroppo, un antinfiammatorio o semplicemente un integratore: quando arriva il momento della terapia, molti cani e soprattutto molti gatti sembrano trasformarsi in esperti nell'arte di evitare qualsiasi medicina.

C'è chi sputa la compressa dopo aver mangiato tutto il boccone, chi scappa appena vede il flacone e chi diventa improvvisamente fortissimo quando si cerca di tenerlo fermo.

La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, con un po' di calma e qualche accorgimento è possibile somministrare un farmaco senza trasformare quel momento in una lotta.




In questa guida vedremo come farlo nel modo più sicuro possibile, evitando errori che potrebbero compromettere la terapia o mettere in difficoltà il nostro animale.

È importante ricordare una regola fondamentale:

non modificare mai una terapia prescritta dal veterinario senza averlo consultato.

Cambiare dosi, sospendere un farmaco perché "sembra stare meglio" oppure sostituire un medicinale con uno trovato in casa può essere molto pericoloso.

Lo scopo di questa guida è aiutarti nella somministrazione, non sostituire le indicazioni del medico veterinario.



Capitolo 1

Le regole da seguire prima di iniziare

Prima ancora di prendere la medicina è bene preparare tutto ciò che serve.

Avere già pronto il materiale evita di dover inseguire il cane o il gatto mentre si cerca il farmaco o un bicchiere d'acqua.

Controlla sempre:


- nome del farmaco;
- dose prescritta;
- orario corretto;
- data di scadenza;
- modalità di conservazione.

Alcuni medicinali devono essere conservati in frigorifero, altri vanno agitati prima dell'uso, altri ancora devono essere assunti a stomaco pieno o a digiuno.

Leggere attentamente le indicazioni può evitare errori.

È utile anche preparare una piccola ricompensa.

Per molti animali ricevere un premio subito dopo la terapia rende il momento molto meno stressante e



favorisce una migliore collaborazione nelle somministrazioni successive.

Infine scegli un ambiente tranquillo.

Televisione ad alto volume, bambini che corrono o altri animali curiosi possono aumentare l'agitazione sia del proprietario sia dell'animale.

Una stanza silenziosa è spesso la soluzione migliore.



Capitolo 2

Come somministrare compresse e capsule

Le compresse sono probabilmente il tipo di farmaco che crea più difficoltà. Alcuni cani le mangiano senza problemi, mentre molti gatti riescono a individuarle anche quando sono nascoste nel cibo.

La prima regola è semplice: **non forzare subito l'animale**. Se esiste un metodo meno stressante, è sempre preferibile provarlo per primo.

Nascondere la compressa nel cibo

Se il veterinario ha confermato che il farmaco può essere assunto insieme al cibo, puoi provare a nascondere in un piccolo boccone particolarmente appetitoso.

Ad esempio:

- un pezzetto di umido;
- un boccone di pollo o tacchino cotto senza sale;
- un formaggin (solo se adatto all'animale e in piccole quantità);

- uno snack morbido specifico per la somministrazione delle pillole.

L'importante è usare una quantità di cibo molto piccola. Se il boccone è troppo grande, il cane o il gatto potrebbe mangiarlo lentamente e accorgersi della presenza della compressa.

Molti proprietari trovano utile offrire prima un boccone "normale", poi quello con la compressa e infine un altro boccone senza farmaco. Questo piccolo trucco riduce le probabilità che l'animale si insospettisca.

Non tutte le compresse possono essere frantumate

Può sembrare una buona idea ridurre una compressa in polvere e mescolarla al cibo, ma non sempre è possibile.

Alcuni medicinali hanno un rivestimento che serve a proteggerli dall'acidità dello stomaco oppure a rilasciare lentamente il principio attivo. Rompere o frantumare queste compresse può renderle meno efficaci o addirittura alterarne l'assorbimento.

Se hai dubbi, chiedi sempre al veterinario o al farmacista veterinario prima di modificare la forma del farmaco.



Quando è necessario metterla direttamente in bocca

Se il cane o il gatto rifiuta qualsiasi alimento contenente il farmaco, può essere necessario somministrare la compressa direttamente.

Per il cane:

- mantieni un atteggiamento tranquillo;
- solleva delicatamente il muso;
- apri leggermente la bocca;
- deposita la compressa il più possibile verso il fondo della lingua;
- richiudi delicatamente la bocca;
- tieni il muso leggermente sollevato e accarezza la gola per favorire la deglutizione.

Per il gatto la procedura è simile, ma richiede ancora più delicatezza. Evita movimenti bruschi e non stringere il muso con forza: un gatto spaventato tenderà a irrigidirsi e sarà più difficile collaborare.

Dopo aver visto che il farmaco è stato deglutito, offri un piccolo premio oppure un po' di alimento gradito, se compatibile con la terapia.

Controlla sempre che la compressa sia stata ingerita



Molti animali sono abilissimi nel fingere di aver deglutito.

Può capitare che trattengano la compressa tra le guance oppure sotto la lingua per poi sputarla qualche secondo dopo, magari appena ci allontaniamo.

Per questo motivo è buona abitudine osservare l'animale per uno o due minuti dopo la somministrazione e controllare che la compressa non venga espulsa.

Una dose non assunta può compromettere l'efficacia della terapia, soprattutto nel caso di antibiotici, farmaci cardiaci o medicinali che devono essere somministrati con regolarità.

Box pratico – Non fare mai questo

-  Non infilare la compressa con forza in gola.
-  Non urlare o sgridare l'animale se rifiuta il farmaco.
-  Non aumentare la dose se pensi che una parte della medicina sia stata persa.
-  Non interrompere la terapia perché "sembra già guarito": molti farmaci devono essere completati fino all'ultima dose prescritta.



Capitolo 3

Come somministrare farmaci liquidi

Sciroppi, sospensioni orali e soluzioni liquide sono spesso più semplici da dosare rispetto alle compresse, ma non sempre sono più facili da somministrare. Un movimento improvviso del cane o del gatto può infatti far fuoriuscire parte del farmaco, rendendo difficile sapere quanta dose sia stata realmente assunta.

Per questo motivo è importante procedere con calma e senza fretta.

Usa sempre la siringa dosatrice

Quando possibile, utilizza la siringa graduata fornita con il medicinale oppure una siringa senza ago della misura indicata.

Evita di usare cucchiaini da cucina: non permettono un dosaggio preciso e possono portare a errori, soprattutto con farmaci che richiedono quantità molto piccole.

Prima della somministrazione verifica sempre di aver aspirato la dose corretta.



La posizione giusta

L'animale dovrebbe trovarsi in una posizione naturale, senza essere costretto a stare sdraiato.

Nel cane è spesso sufficiente farlo sedere.

Con il gatto può essere utile appoggiarlo su un tavolo stabile oppure tenerlo delicatamente avvolto in un asciugamano se tende a muoversi molto, lasciando libera soltanto la testa. Questa tecnica, spesso chiamata "a burrito", aiuta alcuni gatti a sentirsi più contenuti senza ricorrere alla forza.

Come introdurre il liquido

Non versare mai il farmaco direttamente in fondo alla gola.

Inserisci invece la punta della siringa nell'angolo della bocca, nello spazio dietro ai canini, e somministra il liquido lentamente, in piccole quantità.

In questo modo il cane o il gatto avrà il tempo di deglutire spontaneamente.

Se si cerca di svuotare la siringa tutta insieme, aumenta il rischio che il liquido venga sputato o, peggio ancora, finisca nelle vie respiratorie.



Se l'animale tossisce

Una leggera tosse può capitare se il farmaco viene introdotto troppo velocemente.

In questo caso interrompi subito la somministrazione e lascia che l'animale si tranquillizzi prima di riprendere.

Se invece manifesta una tosse intensa, difficoltà respiratoria o sembra aver inalato il liquido, è opportuno contattare il veterinario per ricevere indicazioni.

Posso mescolare il farmaco nel cibo o nell'acqua?


Dipende dal medicinale.

Alcuni farmaci possono essere mescolati a una piccola quantità di alimento umido, mentre altri devono essere assunti da soli perché il cibo ne modifica l'assorbimento.

Anche aggiungerli alla ciotola dell'acqua è generalmente sconsigliato: non è possibile sapere quanto l'animale berrà e quindi quanta medicina assumerà realmente.

Se hai dubbi, chiedi sempre conferma al veterinario prima di modificare le modalità di somministrazione.

Dopo la somministrazione




Quando il farmaco è stato assunto correttamente, premia il cane o il gatto con una carezza, qualche parola tranquilla oppure uno snack consentito dalla terapia.

Trasformare questo momento in un'esperienza il più possibile positiva può rendere molto più semplici anche le somministrazioni successive.

Box pratico – Ricorda

- ✓ Somministra il liquido lentamente.
- ✓ Usa sempre la siringa graduata.
- ✓ Non inclinare eccessivamente la testa all'indietro.
- ✓ Controlla che il farmaco venga realmente deglutito.
- ✓ Se una parte della dose viene sputata, non ripeterla senza aver prima chiesto consiglio al veterinario.



Capitolo 4

Colliri, pomate, gocce auricolari e altri farmaci locali

Non tutti i medicinali devono essere assunti per bocca. In molti casi il veterinario prescrive colliri, pomate oculari, gocce auricolari o prodotti da applicare direttamente sulla pelle.

Anche se possono sembrare più semplici da usare, richiedono attenzione per evitare contaminazioni e per garantire che il farmaco raggiunga davvero la zona da trattare.

Come mettere un collirio

Gli occhi sono estremamente delicati.

Prima di applicare qualsiasi collirio:

- lavati accuratamente le mani;
- controlla che il flacone sia quello corretto;
- verifica la data di scadenza.

Avvicinati con calma e tieni delicatamente la testa del cane o del gatto.



Con una mano abbassa leggermente la palpebra inferiore, creando una piccola tasca naturale.

Con l'altra mano lascia cadere il numero di gocce prescritto, evitando accuratamente di toccare l'occhio con il contagocce.

Una volta applicato il farmaco, lascia che l'animale sbatta le palpebre: sarà lui stesso a distribuire il medicinale su tutta la superficie dell'occhio.

Se sono prescritti più colliri

Può capitare che il veterinario prescriva due farmaci diversi.

In questi casi è importante rispettare l'intervallo indicato tra uno e l'altro, perché applicarli contemporaneamente potrebbe ridurne l'efficacia.

Se non ricordi l'ordine corretto o il tempo di attesa, chiedi chiarimenti al veterinario.

Come applicare una pomata oftalmica

La procedura è molto simile.



La pomata va distribuita in una sottile striscia all'interno della palpebra inferiore, senza mai toccare direttamente l'occhio con il tubetto.

Dopo l'applicazione chiudi delicatamente le palpebre per qualche secondo, in modo da favorire una distribuzione uniforme.

Gocce auricolari

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto nelle orecchie è importante accertarsi che il timpano sia integro.

Per questo motivo non bisogna mai usare farmaci auricolari senza una visita veterinaria, soprattutto se il cane o il gatto manifesta dolore intenso, perdita di equilibrio o secrezioni abbondanti.

Per applicare le gocce:

- tieni fermo il padiglione auricolare;
- inserisci delicatamente il beccuccio senza andare in profondità;
- instilla il numero di gocce prescritto;
- massaggia delicatamente la base dell'orecchio per alcuni secondi.

È normale che subito dopo il cane o il gatto scuota vigorosamente la testa.



Creme e pomate cutanee

Quando il farmaco deve essere applicato sulla pelle:

- pulisci delicatamente la zona, se indicato dal veterinario;
- asciugala bene;
- applica uno strato sottile di prodotto.

Metterne una quantità maggiore non significa ottenere un effetto migliore.

In alcuni casi può essere necessario impedire all'animale di leccare la zona trattata per alcuni minuti oppure utilizzare un collare elisabettiano o altri sistemi di protezione consigliati dal veterinario.

Lavati sempre le mani

Molti farmaci veterinari possono essere assorbiti anche dalla pelle umana oppure risultare irritanti.

Per questo motivo è buona norma lavarsi le mani sia prima sia dopo ogni applicazione.

Questo semplice gesto protegge sia te sia il tuo animale e riduce il rischio di contaminare il medicinale.

Box pratico – Gli errori più comuni



- ✗ Toccare l'occhio con il contagocce.
- ✗ Applicare una quantità eccessiva di pomata.
- ✗ Usare lo stesso flacone per animali diversi senza indicazione del veterinario.
- ✗ Interrompere la terapia appena l'occhio o l'orecchio sembrano migliorati.
- ✗ Utilizzare colliri o pomate destinati alle persone senza una prescrizione veterinaria.



Capitolo 5

Se il cane o il gatto rifiuta il farmaco

Non tutti gli animali accettano facilmente una terapia. Alcuni collaborano fin dal primo giorno, altri diventano diffidenti già alla vista della confezione del medicinale.

È una situazione molto comune e non significa che il tuo cane o il tuo gatto sia "testardo". Spesso sta semplicemente cercando di evitare qualcosa che gli provoca fastidio o che associa a un'esperienza negativa.

L'obiettivo non è vincere una battaglia, ma riuscire a somministrare la terapia con il minor stress possibile.

Mantieni la calma

Gli animali percepiscono molto bene il nostro stato d'animo.

Se ci avviciniamo nervosi, arrabbiati o agitati, aumentano le probabilità che anche loro si irrigidiscano.

Muoviti con calma, parla con voce tranquilla e prepara tutto il necessario prima di iniziare.



Più la procedura è breve, più sarà semplice per entrambi.

Non trasformare il farmaco in un inseguimento

Uno degli errori più frequenti è rincorrere il cane o il gatto per casa.

Ogni tentativo fallito rende il successivo ancora più difficile, perché l'animale inizierà ad associare la tua presenza al momento della terapia.

Se possibile, scegli una stanza tranquilla, chiudi la porta e prepara tutto in anticipo.

Evita di usare la forza

Bloccare un animale con violenza o immobilizzarlo in modo brusco può provocare paura e compromettere il rapporto di fiducia.

Naturalmente esistono situazioni in cui è necessario trattenerlo per pochi secondi, ma deve sempre essere fatto con delicatezza e solo per il tempo strettamente necessario.

Se il cane è di grossa taglia o il gatto è particolarmente reattivo, chiedere l'aiuto di un'altra persona può rendere tutto molto più semplice e sicuro.



Premia sempre la collaborazione

Anche quando la terapia non è gradita, è importante che il momento si concluda con qualcosa di positivo.

Una carezza, qualche parola gentile, un gioco oppure uno snack consentito dal veterinario aiutano l'animale ad associare l'esperienza a qualcosa di piacevole.

Con il tempo molti cani imparano ad accettare la terapia proprio perché sanno che, subito dopo, riceveranno una gratificazione.

Esistono alternative

Se ogni somministrazione diventa una lotta, parlane con il veterinario.

In molti casi esistono formulazioni diverse dello stesso principio attivo, ad esempio:

- farmaci liquidi invece delle compresse;
- paste appetibili;
- capsule aromatizzate;
- preparazioni galeniche realizzate appositamente per l'animale;
- medicinali a lunga durata che richiedono meno somministrazioni.



Non modificare mai la terapia di tua iniziativa, ma chiedi se è disponibile una soluzione più adatta al carattere del tuo cane o del tuo gatto.

Cosa fare se salta una dose

Può capitare di dimenticare una somministrazione oppure di accorgersi troppo tardi che il farmaco è stato sputato.

In questi casi non bisogna improvvisare.

Evita di raddoppiare automaticamente la dose successiva: per alcuni medicinali potrebbe essere rischioso.

Contatta il veterinario e spiega cosa è successo. Ti indicherà come recuperare correttamente la terapia.

Quando chiamare subito il veterinario

Interrompi la somministrazione e chiedi assistenza se, dopo il farmaco, il cane o il gatto manifesta:

- difficoltà respiratorie;
- gonfiore del muso o della lingua;


- 
- 
- 
- vomito ripetuto;
 - tremori o convulsioni;
 - perdita di coscienza;
 - forte debolezza o collasso.

Questi sintomi possono indicare una reazione avversa o allergica e richiedono una valutazione tempestiva.

Box pratico

Le cinque regole d'oro

- ✓ Rispetta sempre dosi e orari prescritti.
- ✓ Non interrompere la terapia senza il parere del veterinario.
- ✓ Conserva correttamente i medicinali.
- ✓ Premia sempre il tuo animale dopo la somministrazione.
- ✓ Se hai dubbi, chiedi prima di improvvisare.



Capitolo 6

Domande frequenti (FAQ)

Anche seguendo attentamente le indicazioni del veterinario, durante una terapia possono sorgere dubbi. Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni.

Posso mescolare il farmaco con il cibo?

Dipende.

Alcuni medicinali possono essere somministrati insieme al cibo senza problemi, mentre altri devono essere assunti a stomaco vuoto oppure potrebbero perdere efficacia se mischiati agli alimenti.

Prima di cambiare le modalità di somministrazione, chiedi sempre conferma al veterinario.

Posso dividere una compressa a metà?



Solo se il veterinario lo ha previsto oppure se la compressa è progettata per essere divisa.

Non tutte le compresse possono essere spezzate: alcune hanno un rivestimento protettivo o un sistema di rilascio graduale che potrebbe essere alterato.

Cosa faccio se il cane o il gatto vomita subito dopo aver preso il farmaco?

Non somministrare immediatamente una seconda dose.

Se il vomito avviene pochi minuti dopo l'assunzione, contatta il veterinario e spiega quanto tempo è trascorso e se hai visto il farmaco tra il materiale vomitato.

Sarà lui a indicarti come procedere.

Se dimentico una dose?

Può succedere.

Non raddoppiare automaticamente quella successiva.

Contatta il veterinario oppure segui le indicazioni specifiche ricevute al momento della prescrizione.



Posso usare farmaci destinati alle persone?

No, salvo diversa indicazione del veterinario.

Molti medicinali comunemente utilizzati dall'uomo possono essere molto pericolosi per cani e gatti, anche a dosi apparentemente basse.

Somministrare farmaci senza una prescrizione può causare gravi danni e, in alcuni casi, mettere a rischio la vita dell'animale.

Il mio animale sembra guarito. Posso interrompere la terapia?


No.

Molte cure, in particolare quelle antibiotiche, devono essere completate fino all'ultima dose prescritta, anche se i sintomi sono già scomparsi.

Interrompere una terapia troppo presto può favorire ricadute o rendere meno efficace il trattamento.


Posso dare due farmaci insieme?

Solo se il veterinario lo ha autorizzato.



Alcuni medicinali possono interferire tra loro oppure richiedere intervalli di tempo precisi tra una somministrazione e l'altra.

Se il tuo cane o il tuo gatto segue più terapie contemporaneamente, chiedi sempre come organizzarle.



Checklist pratica

Prima di somministrare un farmaco

Puoi utilizzare questo piccolo promemoria ogni volta che inizi una terapia.

- ☐ Ho verificato che il farmaco sia quello corretto.
- ☐ Ho controllato la dose prescritta.
- ☐ Sto rispettando l'orario indicato.
- ☐ Ho verificato la data di scadenza.
- ☐ Ho preparato tutto il necessario (siringa, acqua, snack, asciugamano se serve).
- ☐ Mi trovo in un ambiente tranquillo.
- ☐ So se il farmaco deve essere assunto con o senza cibo.
- ☐ Dopo la somministrazione controllerò che il medicinale sia stato realmente ingerito.
- ☐ Se noto una reazione insolita contatterò il veterinario.



Conclusioni

Somministrare un farmaco a un cane o a un gatto non è sempre semplice. Ogni animale ha il proprio carattere, le proprie abitudini e un diverso livello di collaborazione.

La pazienza, la calma e il rispetto dei suoi tempi sono spesso gli strumenti più efficaci.

Ricorda che una terapia eseguita correttamente è parte integrante della cura. Saltare dosi, modificare gli orari o interrompere il trattamento senza indicazione del veterinario può comprometterne l'efficacia.

Se incontri difficoltà, non scoraggiarti. Oggi esistono molte formulazioni diverse e, nella maggior parte dei casi, è possibile trovare insieme al veterinario la soluzione più adatta al tuo cane o al tuo gatto.

L'obiettivo non è soltanto far assumere un farmaco, ma prendersi cura del proprio compagno a quattro zampe nel modo più sereno e sicuro possibile.




Grazie per aver scaricato questa guida.

Se ti è stata utile, aiutaci a mantenerla gratuita e disponibile a chiunque ne abbia bisogno.

AnimaliSOS è un progetto indipendente e non riceve sovvenzioni. Vive esclusivamente grazie alla community. Se vorrai, potrai sostenere liberamente AnimaliSOS visitando:

<https://animalisos.it/aiutaci-ad-essere-di-aiuto>



INDICE

[Come somministrare un farmaco a cane e gatto](#)

[Guida pratica per farlo in sicurezza e senza stress](#)

[Introduzione](#)

[Capitolo 1](#)

[Le regole da seguire prima di iniziare](#)

[Capitolo 2](#)

[Come somministrare compresse e capsule](#)

[Nascondere la compressa nel cibo](#)

[Attenzione a schiacciare le compresse](#)

[Quando è necessario metterla direttamente in bocca](#)

[Controlla sempre che la compressa sia stata ingerita](#)

[Capitolo 3](#)

[Come somministrare farmaci liquidi](#)

[Usa sempre la siringa dosatrice](#)

[La posizione giusta](#)

[Come introdurre il liquido](#)

[Se l'animale tossisce](#)

[Posso mescolare il farmaco nel cibo o nell'acqua?](#)

[Dopo la somministrazione](#)

[Box pratico – Ricorda](#)

[Capitolo 4](#)

[Colliri, pomate, gocce auricolari e altri farmaci locali](#)

[Come mettere un collirio](#)

[Se sono prescritti più colliri](#)

[Come applicare una pomata oftalmica](#)

[Gocce auricolari](#)

[Crema e pomate cutanee](#)

[Lavati sempre le mani](#)

[Box pratico – Gli errori più comuni](#)

[Capitolo 5](#)

[Se il cane o il gatto rifiuta il farmaco](#)

[Mantieni la calma](#)

[Non trasformare il farmaco in un inseguimento](#)

[Evita di usare la forza](#)

[Premia sempre la collaborazione](#)

[Esistono alternative](#)

[Cosa fare se salta una dose](#)

[Quando chiamare subito il veterinario](#)

[Box pratico](#)

[Le cinque regole d'oro](#)

[Capitolo 6](#)

[Domande frequenti \(FAQ\)](#)

[Posso mescolare il farmaco con il cibo?](#)

[Posso dividere una compressa a metà?](#)

[Cosa faccio se il cane o il gatto vomita subito dopo aver preso il farmaco?](#)

[Posso usare farmaci destinati alle persone?](#)

[Il mio animale sembra guarito. Posso interrompere la terapia?](#)

[Posso dare due farmaci insieme?](#)

[Checklist pratica](#)

[Prima di somministrare un farmaco](#)

[Conclusioni](#)